

SIGMOIDEOSKOPI

Sigmoideoskopi er en kikkertundersøgelse hvor man fører en lillefinger tyk bøjelig slange op i endetarm og venstre side af tyktarmen.

Undersøgelsen kan påvise årsagen til f.eks. blødning, smerter eller afføringsbesvær. Undersøgelsen kan desuden påvise kræftknode i endetarmen eller venstre del af tyktarmen.

Hvis der er behov for at tage vævsprøver, kan denne foretages uden smertestillende eller beroligende medicin.

Undersøgelsen varer typisk 5-10 minutter og gennemføres hos de fleste uden væsentligt ubehag. Brug af smertestillende/beroligende medicin er derfor ikke nødvendig.

FORBEREDELSE

For at få et godt resultat af undersøgelsen er det vigtigt at tarmen er rensset grundigt ud. Udrensningen gøres ved hjælp af **MICROLAX**.

Når du bestiller tid til konsultation i Kirurgisk Klinik i Næstved, søger vi for at sende dig en detaljeret vejledning om undersøgelsen og den måde du skal forberede dig på til sigmoideoskopi.

ER UNDERSØGELSEN FARLIG?

Sigmoideoskopi er en sikker undersøgelse. Komplikationer forekommer yderst sjældent.

Vi vil gerne høre fra dig hvis du inden for de nærmeste dage efter undersøgelsen observerer:

- blødning fra tarmen
- mavesmerter
- kulderystelser og feber over 38,2

Hvis der derfor opstår smerter eller feber inden for de første 8 dage skal du ses af læge.